→ MINISTERE DE L'AGRICULTURE ⊏ DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX Ancienne Conserverie de CASAMOZZA LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70

EDITION CORSE

Bulletin Technique Nº 127 8 Août 1988

VIGNE

** Pourriture grise (rappel)

Pour les cépages tardifs, à grappes serrées, un traitement anti-botrytis spécifique doit être réalisé debut veraison.

** Cochenilles Farineuses (rappel)

On les observe sur feuilles et grappes . Des dépots de fumagine sont déjà visibles sur pampres et feuilles. Les fourmis attirées par le miellat sont nombreuses. Ces indices doivent attirer votre attention !. Repérez les pieds atteints et ne tardez pas pour effectuer un traitement.

acariens

Les populations remontent rapidement sous l'influençe du temps chaud. Intervenez dés que 30 % des feuilles sont occupées.

Tordeuses de la grappe

Les captures augmentent dans les situations favorables. Le traitement préventif pourra être réalisé à partit du 10 août, dans les secteurs de la plaine orientale ou le risque de botrytis est élevé. Une bonne protection contre cette génération est necessaire.

Ce vol risque cette année encore d'être trés étalé . Préferez des produits à remanence longue.

Imprimerie de la Station de CASAMOZZA Directeur - Gérant : J.C. COQUET

Abonnement Annuel : Régisseur de Recettes

·rd

ériodique Publication Pe CPPAP Nº 17

I S S N C7 39 - 9633

P151

Dans les secteurs moins exposés, seule une observation des glomérules pourra dans quelques jours déterminer l'opportunité d'un traitement.

ARBRES FRUITIERS

** Acariens sur pêchers

Ils sont trés nombreux et les vergers fréquemment atteints. On observe des adultes et d'importants dépôts d'oeufs d'été.

Bien choisir un produit ayant une efficacité sur larves et adultes mais également sur oeufs d'été.

(C) **SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 1988** - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.